



COSAVET DF EDGE

ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

COSAVET DF EDGE è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali. È adatto per l'impiego in strategie antiresistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo di azione. La particolare formulazione di **COSAVET DF EDGE** consente l'impiego a dosaggi contenuti ed un'applicazione semplice e sicura per l'operatore.

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da selenio) 80 %

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili (WG)

MECCANISMO D'AZIONE

FRAC CODE M 02

CLASSIFICAZIONE CLP

Attenzione



REGISTRAZIONE

n. 15149 del 23/03/2011 (Titolare della registrazione SULPHUR MILLS LIMITED)



Per visualizzare l'etichetta, la scheda di sicurezza e altro materiale, scarica la BELCHIM ITALIA APP inquadrando il QR CODE

CONFEZIONE



10 Kg
25 Kg

COLTURA	AVVERSITÀ	NOTE	DOSE	TEMPO DI CARENZA
VITE	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	-	200 - 400 g/hl	5 gg
POMACEE	Oidio (<i>Podosphaera spp.</i>) Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> e <i>V. pirina</i>)	Inizio primavera a quantità decrescenti	200 - 500 g/hl	
		Dopo la fioritura	200 - 300 g/hl	
DRUPACEE	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Podosphaera tridactylia</i>)	Prima della fioritura e dopo la raccolta	400 - 600 g/h	
		Dopo la fioritura fino alla raccolta	200 g/hl	
FRAGOLA	Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Dopo la fioritura la dose più bassa	200 - 300 g/hl	
NOCCIOLO	Oidio (<i>Phyllactinia suffata</i>) Eriofide (<i>Phytophthora avellanae</i>)		200 - 300 g/hl	
ORTAGGI, FLOREALI ED ORNAMENTALI	Oidio		150 - 250 g/hl	
POMODORO	Acaro rugginoso (<i>Aculops lycopersici</i>)	-	200 - 300 g/hl	
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Oidio (<i>Microsphaera betae</i>)		6 - 8 kg/ha	
CEREALI	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)		6 - 8 kg/ha	
TABACCO			125 - 150 g/hl	
QUERCIA	Oidio (<i>Microsphaera quercina</i>)	Trattamenti invernali	300 g/hl	
		Trattamenti primaverili-estivi	100 - 200 g/hl	

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. In caso di trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale. Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini, oli minerali, Captano. In casi di miscela con altri formulati rispettare il tempo di carenza più lungo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento
a quanto in vigore al momento della conclusione del progetto grafico - 31/10/2021