



Inquadra il QRcode e scarica l'etichetta aggiornata

ERBICIDA

Pomodoro

ERBICIDI

Culture	Principali avversità controllate	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Pomodoro	<p>Infestanti graminacee sensibili: avena selvatica (<i>Avena spp.</i>), sanguinella (<i>Digitaria spp.</i>), giavone (<i>Echinochloa spp.</i>), panico delle risaie (<i>Panicum dichotomiflorum</i>), panico coltivato (<i>Panicum miliaceum</i>), scagliola (<i>Phalaris spp.</i>), panicastrella (<i>Setaria spp.</i>), sorghetta (<i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum halepense</i> da seme e da rizoma).</p> <p>Infestanti a foglia larga sensibili: cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>), amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>), ambrosia (<i>Ambrosia spp.</i>), visnaga maggiore (<i>Ammi majus</i>), forbicine (<i>Bidens bipinnata</i>), borsa del pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>), vilucchio bianco (<i>Calystegia sepium</i>), rucola violacea (<i>Diplotaxis spp.</i>), fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>), galinsoga (<i>Galinsoga parviflora</i>), topinambur (<i>Helianthus tuberosus</i>), camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), menta campestre (<i>Mentha arvensis</i>), <i>Orobanche spp.</i>, aspraggine comune (<i>Picris echioides</i>), ranuncolo (<i>Ranunculus spp.</i>), miagro peloso (<i>Rapistrum rugosum</i>), senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>), crespino (<i>Sonchus spp.</i>) e nappola (<i>Xanthium spp.</i>)</p>	<p>50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Vivolt allo 0,1%. In presenza di <i>Solanum nigrum</i> applicare 50 g/ha di Executive Gold + Vivolt allo 0,1% entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni.</p> <p>In presenza di farinello (<i>Chenopodium spp.</i>), correggiola (<i>Polygonum spp.</i>) e erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>) è opportuna la miscela con prodotti a base di metribuzin alle dosi consigliate</p> <p>Con infestazione di giavone (<i>Echinochloa spp.</i>) applicare 50-60 g/ha di Executive Gold + Vivolt allo 0,1%, in caso di reinfestazioni successive, effettuare un secondo trattamento con 30 g/ha di Executive Gold + Vivolt allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.</p> <p>In presenza di <i>Orobanche spp.</i> prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. La prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco florale, le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima.</p>	2 (3 solo su orobanche)	30 giorni
Patata		50-60 g/ha con aggiunta di bagnante. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di Executive Gold + Vivolt allo 0,1%.	2	30 giorni
Mais		50-60 g/ha addizionato con bagnante Vivolt allo 0,1%. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (<i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Ciperacee</i> , <i>Digitaria spp.</i> , ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha.	2	80 giorni

CARATTERISTICHE:

Erbicida non residuale di post-emergenza per il controllo delle infestanti del mais, della patata e del pomodoro. A base di rimsulfuron, solfonilurea attiva per assorbimento fogliare e successiva traslazione sistemica ai meristemi apicali dove, nelle specie sensibili, viene inibita la divisione cellulare.



Registrazione: N° 16565 del 16/02/2016 del Ministero della Salute

COMPOSIZIONE:

Rimsulfuron p.a. puro 25 g
Coformulanti q. b. 100 g
Contiene fosfato disodico

FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONE:

Barattolo con dosatore da 100 g
Barattolo con dosatore da 500 g

CONTENUTO PALETTA:

135 x 10 x 0,1
27 x 10 x 0,5

CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE

GRUPPO HRAC	B	ERBICIDI
GRUPPO WSSA	2	