

FEINZIN[®] 70 DF

Erbicida di pre-semina/emergenza per soia, patata, pomodoro e altre colture orticole e di post-emergenza per carota, frumento e orzo.



0,25 kg



FORMULAZIONE:
Microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:
Metribuzin 70% (700 g/kg)

HRAC:
C1

N. REGISTRAZIONE:
14058 del 17-01-2012

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Patata	0,25 - 0,4 kg/ha	In pre-emergenza; dose maggiore sui terreni pesanti	-
	0,25 - 0,3 kg/ha	In post-emergenza; dose maggiore sui terreni pesanti	
Pomodoro	0,25 - 0,3 kg/ha	In pre-semina e pre-trapianto; intervenire 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare	30 giorni
	0,25 - 0,4 kg/ha	In post-emergenza e post-trapianto; intervenire quando le piantine hanno differenziato almeno 8-9 foglie	
Carota	0,25 - 0,35 kg/ha	Trattare in post-emergenza dallo stadio di 3 foglie vere	60 giorni
Soia	0,25 - 0,35 kg/ha	In pre-semina o pre-emergenza. Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi	60 giorni
Erba medica	0,5 - 0,75 kg/ha	Adottare la dose minore su terreni leggeri e la dose maggiore su terreni a medio impasto, pesanti e molto pesanti, intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo	60 giorni
Frumento tenero e duro, Orzo	0,1 kg/ha	Intervenire in post-emergenza dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento	-
Pisello, Cece, Fava, Favino, Lenticchia	0,15-0,20 kg/ha	In pre-emergenza	-
Finocchio trapiantato	0,15 kg/ha	Applicare in post-trapianto, dopo il superamento della crisi di trapianto	40 giorni
Asparago	0,25-0,5 kg/ha	Applicare in pre-emergenza dei turioni su asparagie di almeno 2 anni. Impiegare la dose inferiore nei terreni particolarmente sciolti	-
	0,25-0,4 kg/ha	Applicare in post-raccolta su asparagie di almeno 2 anni. Impiegare la dose inferiore nei terreni particolarmente sciolti	

Per le colture registrate è possibile anche l'applicazione su colture porta seme con le stesse modalità.

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI

<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)	<i>Mercurialis annua</i> (Mercorella)
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)	<i>Panicum</i> spp. (Panico)
<i>Anagallis arvensis</i> (Anagallide)	<i>Poa annua</i> (Fienarola)
<i>Atriplex patula</i> (Atriplice maggiore)	<i>Polygonum</i> spp. (Poligono)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore)	<i>Portulaca oleracea</i> (Erba porcellana)
<i>Centaurea cyanus</i> (Fiordaliso)	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ravanello selvatico)
<i>Chenopodium album</i> (Farinaccio)	<i>Senecio vulgaris</i> (Erba calderina)
<i>Chenopodium</i> spp. (Farinello)	<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella)	<i>Sonchus oleraceus</i> (Crespino comune)
<i>Fumaria</i> spp. (Fumaria)	<i>Spergula arvensis</i> (Spergola)
<i>Geranium</i> spp. (Geranio)	<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Lamium</i> spp. (Falsa ortica)	<i>Thlaspi</i> spp. (Erba storna)
<i>Lolium</i> spp. (Loglio)	<i>Urtica dioica</i> (Ortica)
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla)	<i>Veronica</i> spp. (Veronica)



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.