


Flint® Max

Flint Max è il fungicida dal duplice meccanismo d'azione per un controllo completo delle principali malattie fungine.


FLINT® MAX

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE g/ha	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Vite (da vino)	Oidio	180-200	Ogni 12-14 giorni.	14
Melo	Ticchiolatura, Oidio, Alternariosi	300	Ogni 10-12 giorni.	14
Pero	Ticchiolatura, Maculatura bruna	300	Ogni 10-12 giorni.	14
Pesco, Nettarino, Albicocco, Susino, Ciliegio	Oidio, Monilia, Bolla	300	Ogni 12-14 giorni.	7
Olivo	Occhio di pavone, Lebbra	250	-	Fino a pre-fioritura
Pomodoro, Peperone	Oidio	300	Ogni 8-12 giorni.	3
Cetriolo, Zucchini, Melone, Anguria, Zucca	Oidio	300	Ogni 8-12 giorni.	3



12 x 500 g


Composizione: Trifloxystrobin 25%
Tebuconazolo 50%

Formulazione: Granuli idrosospensibili

Classificazione:

 ATTENZIONE

Registrazione: n. 13689 del 25.11.2011

© = Marchio registrato