

FUSILADE® MAX

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA
SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE SIA ARBOREE

COMPOSIZIONE

Fluazifop - p - butile puro
13,40 % (= 125 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 11353 del 05-06-2002	EC Emulsione concentrata	In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.	720 800 680	1 L 5 L 10 L	 ATTENZIONE H361, H411, EUH401
BUFFER ZONE	GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	
—	A	3082	9	Nufarm	Nufarm Italia S.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro Drupacee: pesco (nettarina e percoca), ciliegio, susino Pomacee: melo, pero Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo Olivo, Vite Ortaggi: lattuga, cicoria, carciofo, cetriolo, melanzana, carota, ravanella, cipolla	Avena (<i>Avena</i> spp), Falaride (<i>Phalaris</i> spp), Coda di volpe (<i>Alopecurus</i> spp), Bromo (<i>Bromus</i> spp), Ricacci di frumento (<i>Triticum</i> spp), Ricacci di orzo (<i>Hordeum</i> spp)	0,75 - 1,0 l/ha	Graminacee a nascita autunnale. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1-3 foglie fino a inizio accestimento. Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di Fusilade Max in 100 lt d'acqua).	30 gg	
		Loglio (<i>Lolium</i> spp)			
Fava da granella, fagiolino, fagiolo da granella, pisello. Intervenire prima della fioritura Patata Barbabietola da zucchero Foraggiere leguminose: trifoglio Tabacco	Giavone (<i>Echinochloa</i> spp), Setaria (<i>Setaria</i> spp), Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	1,25 - 2,0 l/ha	Graminacee a nascita primaverile. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1-3 foglie fino a inizio accestimento. Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di Fusilade Max in 100 lt d'acqua).	—	2
Oleaginose: girasole, soia, colza				50 gg	
Floreali in pieno campo ed in serra: rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia	Sorghetta da rizoma (<i>Sorghum halepense</i>)	2,0 l/ha	Va trattata ad un'altezza di 30-50 cm. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di Fusilade Max in 100 lt d'acqua).	60 gg	
				90 gg	
				—	

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-400 lt/ha) onde favorire l'uniforme copertura della vegetazione.

L'erba fienarola (*Poa annua*) è mediamente resistente. Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOTA: DA NON USARE SU TERRENI SABBIOSI.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. E' obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).