Switch®

FUNGICIDA ANTIBOTRITICO PER VITE, COLTURE ORTICOLE E FLOREALI SPECIFICO ANCHE CONTRO MONILIOSI DELLE DRUPACEE E MACULATURA BRUNA DEL PERO

FUNGICIDA

Vite | Frutta | Orticole | Floreali e ornamentali

SWITCH è un fungicida particolarmente efficace nei confronti della Muffa grigia e di altri marciumi di numerose colture.
In viticoltura è registrato anche per il controllo dei marciumi secondari del grappolo (*Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp.).
Grazie all'associazione complementare e sinergica di Fludioxonil (fenilpirrolo) e Cyprodinil (anilinopirimidina), si distingue per livello di efficacia e durata della protezione anche nei confronti di popolazioni di funghi resistenti o solo parzialmente sensibili ad altri fungicidi in commercio.
SWITCH è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili. SWITCH non influenza la maturazione delle uve, i processi di fermentazione e di vinificazione e le qualità organolettiche dei vini.

COMPOSIZIONE
Cyprodinil 37,5%
Fludioxonil 25%

FORMULAZIONE
granuli idrodisperdibili

NUMERO DI REGISTRAZIONE
9578 del 2.4.98

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Colture	Patogeni	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Epoche d'impiego	Intervallo di sicurezza
Vite	Muffa grigia Marciumi secondari del grappolo (*Aspergillus* spp. *Penicillium* spp.)	80	0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi.	7 gg uva da tavola 21 gg uva da vino
Tabacco	Alternaria	80	0,6	2 trattamenti alla cimatura	—
Fragola *(in pieno campo e serra)*	Muffa grigia	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.	2 gg in campo 1 gg in serra
Mora Lampone *(in pieno campo)*	Muffa grigia	100	1	Effettuare massimo 3 trattamenti per stagione: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti	14 gg
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino *(in pieno campo e serra)*	Muffa grigia	60 - 80	0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.	3 gg
Albicocco Pesco Ciliegio Susino	Monilia dei rami e dei fiori *(Monilinia laxa)* Monilia dei frutti *(Monilinia* spp.*)*	30 60	0,3 1	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta.	7 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Bagnare accuratamente la vegetazione e i frutti. Con attrezzature a basso ed ultra basso volume rispettare la dose consigliata per ettaro.
Il prodotto è miscibile con i fungicidi e gli insetticidi di più comune impiego.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	DOSI (g/hl)	DOSI (kg/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Lattuga e insalate, Erbe fresche *(in pieno campo e serra)*	Marciume del colletto *(Sclerotinia* spp.*)* Muffa grigia	50 - 70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.	7 gg
Finocchio *(in pieno campo)*	Marciume del colletto *(Sclerotinia* spp.*)*	60 - 80	0,8	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.	7 gg
Pero	Maculatura bruna *(Stemphylium vesicarium)*	60 - 80	1	Da allegagione ad intervalli di 10 giorni e in pre-raccolta contro il marciume dei frutti. Effettuare al massimo 3 trattamenti per stagione.	3 gg
Cipolla, aglio, scalogno, cipolline *(in pieno campo)*	Muffa grigia	80 - 100	1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.	21 gg aglio e scalogno 7 gg cipolla, cipolline
Fagioli e piselli freschi con baccello, Lenticchie fresche, Fagioli da granella *(in pieno campo)*	Sclerotinia *(Sclerotinia* spp.*)* Antracnosi *(Colletotrichum* spp.*)* Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*	—	1	Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.	28 gg fagioli da granella 14 gg fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche
Floreali *(in pieno campo e serra)*	Muffa grigia	80	1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi.	—

IMPORT TOLERANCE APPROVED

CONFEZIONI

scatole da **250 g**
in cartoni da 20 pezzi

scatole da **1 kg**
in cartoni da 10 pezzi