

Sivanto® Prime

Sivanto Prime è l'insetticida sistemico dotato di superiore rapidità d'azione contro afidi, aleurodidi e cicaline di vite, frutta e orticole.



SIVANTO® prime

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE ml/100 litri	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Vite da tavola e da vino	Cicaline (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Metcalfa pruinosa</i>)	60 (0,5 L/ha)	Per il momento di intervento contro scafoideo, seguire le indicazioni degli enti ufficiali.	14
	<i>Empoasca vitis</i> (= <i>flavescens</i>)	40 (0,3 L/ha)		
Melo, Pero	Afide grigio	60-75 (0,6-0,9 L/ha)	Applicare in pre-fioritura (bottone florale). Oppure in post-fioritura (caduta petali).	
	Afide verde	60-75 (0,6-0,9 L/ha)	Applicare dopo la fioritura ad inizio infestazione.	
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in pieno campo)	Afidi	60-75 (0,45-0,56 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	3
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in serra)	Afidi	60-75 (0,45-1,125 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione, se necessario ripetere l'applicazione dopo 10 giorni.	
	Aleurodidi	75 (0,56-1,125 L/ha)		
Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo)	Afidi	60-75 (0,45-0,56 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	
Cetriolo, Cetriolino (in serra)	Afidi	60-75 (0,45-1,125 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione, se necessario ripetere l'applicazione dopo 10 giorni.	
	Aleurodidi	75 (0,56-1,125 L/ha)		
Zucchini, Cocomero (in pieno campo)	Afidi	60-75 (0,45-0,56 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	
Zucchini, Cocomero (in serra)	Afidi	60-75 (0,45-0,56 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione, se necessario ripetere l'applicazione dopo 10 giorni.	
	Aleurodidi	75 (0,56-1,125 L/ha)		
Lattuga (in pieno campo)	Afidi	75 (0,625 L/ha)	Applicare all'inizio dell'infestazione, <u>non prima dell'inizio della formazione del cespo.</u>	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE ml/100 litri	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Fragola (in serra)	Afidi	60 (0,5 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	3
	Aleurodidi	75 (0,625 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione, se necessario ripetere l'applicazione dopo 10 giorni.	
Lampone, More di rovo (in serra)	Afidi	100 (1 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione, se necessario ripetere l'applicazione dopo 10 giorni.	
Bulbose da fiore (in serra)	Afidi	50-60 (0,5 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	-
Piante ornamentali e da fiore (in serra)	Aleurodidi	75 (0,75 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione, se necessario ripetere l'applicazione dopo 7 giorni.	
Vivaio di essenze arboree, forestali e fruttiferi (in serra)	Afidi	60-75 (0,6-0,75 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	
	Aleurodidi	75 (0,75 L/ha)		
Tabacco	Afidi	60 (0,5 L/ha)	Intervenire ad inizio infestazione.	



Composizione: Flupyradifurone 17,1% (= 200 g/L)

Formulazione: Concentrato solubile

Classificazione: ATTENZIONE

Registrazione: n. 16273 del 04.02.2019



20 x 250 ml



12 x 1 L

© = Marchio registrato