

**CAPTAIN 48 SC**  
**Fungicida per melo e pero in sospensione concentrata**  
**Meccanismo d'azione: Gruppo M4 (FRAC)**

Composizione:  
100g di prodotto contengono:  
- Captano puro .....g. 41.6 (480g/L)  
- Coformulanti: quanto basta a .....g. 100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H351 Sospettato di provocare il cancro;  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea;  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente secondo le disposizioni locali; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico; P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente; P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Titolare della registrazione:**  
**Sharda Europe bvba**  
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium  
Tel. +39 02 3604 2884

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 16649 del 02/10/2020**

**Stabilimenti di produzione e confezionamento: Chemia S.p.A., S.S. km 46- S. Agostino (FE) // I.R.C.A. Service S.p.A.S.S. Cremasca 591 n°1 Fornovo S.Giovanni (BG) // AgroSmart Limited, Unit 1C, Victoria Court, Colliers Way, Clayton West Hudders field, West Yorkshire, HD8 9TR (UK).**

**Stabilimenti di confezionamento: AGROPAK Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina Id Polonia // Pakon Sp.z o.o., ul.Zakładowa 7, 62-510 Konin (Polonia) // AGROTOTAL Produtos Agroquimicos, S.A. R. Dos Navegantes, No. 48 - R/C Esq. 1200 - 732 Lisboa Portogallo // Móraagro Kft. 3937 Komlóská, Rákóczi út 121. Ungheria // FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia**

**Taglie:** ml 500; L 1-5-10-25

**Partita n.:**

**Prescrizioni supplementari**

Non contaminare l'acqua con il prodotto ed il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Usare guanti adatti durante le fasi di miscelazione, carico ed applicazione del prodotto e tuta da lavoro e stivali impermeabili durante l'applicazione. Per eventuali lavorazioni da

svolgere dopo il trattamento, utilizzare guanti adatti ed adeguati indumenti da lavoro. Non rientrare nelle aree trattate prima che queste siano completamente asciutte.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m di cui 20 m vegetati oppure una fascia vegetata di 20 m con utilizzo di attrezzature che riducano la deriva del 50% oppure una fascia vegetata di 10 m con utilizzo di attrezzature che riducano la deriva del 90%.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.**

**Modalità e dosi di impiego**

CAPTAIN 48 SC è un fungida preventivo, che agisce per contatto, da impiegarsi su melo e pero.

Coltura	Patogeno	Dose L/ha	Indicazioni di impiego	N. max trattamenti /anno
Melo e pero	Ticchiolatura	3.0 l/ha (1000-1500 lt acqua/ha)	Impiegare il prodotto dalla comparsa dei mazzetti florali (BBCH51/aprile). Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.	4

**Compatibilità:** In caso di miscelazione effettuare dei saggi di compatibilità con il prodotto da miscelare.

**Fitotossicità:** Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Stayman, Delicious, Renetta del Canada) e di Pero (Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

Per ridurre l'insorgere di fenomeni di resistenza, si consiglia l'impiego di fungicidi con diverso meccanismo d'azione.

**Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.**

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.